

Hej medlemmar,

Vi har vinbärsgallkvalster på området och därför behöver alla odlare i Enskede titta över knopparna på sina svarta vinbärsbuskar och även på sina röda vinbär, om de är drabbade av kvalster.

Om de är runda i formen, alltså inte ovala eller ”knoppformade” som är den normala formen, behöver dessa knoppar och grenar de sitter på tas bort och kastas i brännbart. Det måste ske nu innan knoppningen.

Görs det för sent hinner kvalstren falla ner i jorden i väntan på nästa års livscykel. Kvalster för med sig virussjukdomar och påverkar buskarnas förmåga att ge bär. De sprider sig också lätt till andra buskar i området. Det finns redan många drabbade buskar i området.

För svarta vinbärsbuskar gäller att, om det är fler än 15-20 stycken drabbade knoppar måste hela busken grävas upp.

Med de röda vinbären räcker det oftast att alla grenar med kvalster i knopparna klipps bort och naturligtvis också samlas ihop och kastas i de brännbara soporna.

De svarta vinbärsbuskarna som är extra drabbade görs alltså först en beskärning nu under vårvintern innan knoppning och uppgrävning av hela plantan senare när jorden går att bruka.

Läs mer om kvalster i den bifogade pdf-dokumentet från Ulf från Fritidsodlarnas Riksorganisation.

Med vänlig hälsning, Styrelsen EGK

--

Styrelsen, Enskede gårds koloniträdgårdar
22-04-11